





563 L59 Ath

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES.

## HYMÉNOPTÈRES./

PAR M. LE COMTE

#### AMÉDÉE LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MOSCOU, DE CELLE DE DIJON, DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS ET DE VERSAILLES, ET DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

## Atlas

Renfermant 48 planches gravées sur acier.

## PARIS.

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUE HAUTEFEUILLE, Nº 10 BIS.



### EXPLICATION DES PLANCHES

DES

## INSECTES HYMÉNOPTÈRES.

#### PLANCHE PREMIÈRE.

Fig. 1. Aile sur-complète, en ce que la partie caractéristique a deux cellules radiales.

Fig. 2. La même aile que celle de la fig. 1, divisée en quatre parties espacées entre elles, mais placées en situation.

La première de ces parties contient les cellules 1, 2, 3, 4 (cellules brachiales); elle s'attache au corselet par la portion où aboutissent les lignes ponctuées b, c, d, e, f. Cette première partie s'appelle partie brachiale.

- Première cellule (espace membraneux renfermé entre des nervures) brachiale.
- 2. Deuxième cellule brachiale.
- 3. Troisième cellule brachiale.
- 4. Quatrième cellule brachiale.
- b. Nervure, appelée radius supérieur, occupant une partie du bord extérieur de l'aile, de la base au point épais.
- c. Cubitus supérieur, nervure qui sépare la première cellule brachiale de la deuxième.
- d. Première nervure intermédiaire : la troisième des nervures brachiales, séparant la deuxième cellule brachiale de la troisième.
- e. Deuxième nervure intermédiaire : la quatrième des nervures brachiales, séparant la troisième cellule brachiale de la quatrième.
- f. Bord intérieur de l'aile, bornant la quatrième cellule brachiale.

La deuxième partie de l'aile contient : 1° le point épais a, portion de l'aile située sur le bord extérieur, un peu passé son milieu, épaisse, et le plus souvent opaque ; 2° la cellule ou les cellules radiales (il peut y avoir trois cellules radiales, comme dans le genre Xyela); 3° la cellule ou les cellules cubitales. Cette deuxième portion de l'aile s'appelle partie caractéristique, à cause des nombreux caractères que le système alaire doit en tirer.

- 5. Première cellule radiale.
- 5. bis. Deuxième cellule radiale.
- 6. Première cellule cubitale.
- 6 bis. Deuxième cellule cubitale.
- 6 ter. Troisième cellule cubitale.
- 6 quater. Quatrième cellule cubitale.
- a. Point épais.
- b bis. Radius inférieur. Cette nervure sépare la cellule radiale (ou

les cellules radiales quand il y en a plusicurs), de la cellule cubitale (on des cellules cubitales quand il y en a plusicurs). Elle va rejoindre le bord extérieur de l'aile g.

- c bis. Cubitus inférieur. Cette nervure sépare la cellule cubitale (ou les cellules cubitales quand il y en a plusieurs), de la troisième partie de l'aile ou disque, et de la quatrième ou limbe.
- g. Nervure fermant la partie inférieure du bord extérieur de l'aile. La troisième partie contient les cellules discoïdales. Cette portion s'appelle disque ou partie discoïdale, parce qu'elle occupe le milieu de l'aile.
  - 7. Première cellule discoudale.
  - 8. Deuxième cellule discoidale.
  - 9. Troisième cellule discoïdale.

Nota. Cette partie de l'aile, étant enveloppée par les trols autres, pour éviter la confusion, nous n'avons pas désigné par des lettres et des lignes ponctuées, les nervures lui appartenant qui nous servent dans nos caractères alaires; nous remarquerons seulement que: 1° le cubitus inférieur sépare de la partie caractéristique les première et deuxième cellules discoïdales; 2° la nervure d'intersection des première et troisième discoïdales (c'est-à-dire qui les sépare l'une de l'autre), est la première nervure récurrente; et la nervure d'intersection de la troisième discoïdale et du limbe (ou quatrième partie de l'aile), est la deuxième nervure récurrente: ces désignations de situation nous paraissent suffire pour les faire distinguer.

La quatrième partie de l'aile contient les cellules du limbe. Cette portion s'appelle limbe, et est ordinairement séparée de la partie caractéristique par le cubitus inférieur, et de la troisième cellule discoïdale par la deuxième nervure récurrente. Son bord extérieur est le bord postérieur de l'aile.

- 10. Première cellule du limbe.
- 11. Deuxième cellule du limbe.

Nota. Dans la fig. 2, où les quatre parties de l'aile sont séparées et espacées entre elles, nous avons considéré les nervures qui bornent ces portions, comme se divisant par moitié longitudinalement, de manière que chacune des moitiés longitudinales de ces nervures appartint aux portions de l'aile qu'elles renferment.

Fig. 3. Aile complète: quatre cellules brachiales sous les n° 1, 2, 3 et 4; le point épais a; une cellule radiale 5; trois cellules cubitales sons les n° 6, 6 bis, 6 ter (sans rendre l'aile sur-complète, il pourrait y avoir une quatrième cellule cubitale qui serait 6 quater, comme dans la fig. 1); trois cellules discoïdales sous les n° 7, 8, 9; deux cellules du limbe sous les n° 10 et 11.

Nota. Les ailes des fig. 1 et 2 ne sont sur-complètes que parce qu'il y a deux cellules radiales au lieu d'une seule.

Fig. 4. Aile incomplète. Dans cette figure, les mêmes numéros désignent les mêmes cellules, et les lettres les mêmes nervures que dans les trois précédentes. Cette aile n'est incomplète que parce que la cellule n° 7 (première ce lule discoïdale), manque, c'est-à-dire est confondue avec la cellule n° 6 (première cellule cubitale), n'en étant pas séparée par une nervure. On doit remarquer dans cette aile: 1° que la première cellule brachiale, sous le n° 1, est divisée en deux par une nervure presque transversale, ce qui ar-

rive dans quelques genres; 2º que la quatrième cellule brachiale, sous le nº 4, est également divisée par quelques nervures obliques, qui se retrouvent dans plusieurs genres, en plus ou moins grand nombre; 3º que la nervure c bis ou cubitus inférieur est oblitérée à sa partie supérieure, ce qui occasionne la réunion des espaces qui forment, dans les fig. 1, 2 et 3, les cellules 6 (première cubitale) et 7 (première discoïdale), et par conséquent confusion de cette dernière avec la première : 4º la nervure b bis ou radius inférieur, émet, vers son bout postérieur, une petite branche qui se dirige vers le bout de l'aile et forme un commencement de petite cellule au hout de la radiale nº 5; cette petite cellule s'appelle appendice de la radiale ; ici il est incomplet, parce que la branche du radius inférieur, qui le forme, n'atteint pas la nervure g, qui ferme la partie inférieure du bord extérieur de l'aile : il serait dit complet si cette branche atteignait ce bord; 5º dans cette même aile la cellule nº 11, ou deuxième cellule du disque, est incomplète, parce que la nervure, qui devrait la séparer de la première cellule de cette partie de l'aile portant le nº 10, n'atteint pas le bord postérieur de l'aile dans la figure que nous expliquons. Il n'y a point d'appendice dans les ailes des lig. 1, 2 et 3, parce que le radius inférieur n'émet pas de branche.

Fig. 5. Aile la plus incomplète de celles que je connais. On n'y distingue, outre les bords, que le point épais a, un peu pédiculé, c'est-à-dire porté par une petite nervure. (Ordinairement le point épais est sessile sur le bord extérieur, comme dans les fig. 1, 2, 3, 4.) Cette petite nervure, par le point où elle part du bord extérieur au bout du radius supérieur, doit être considérée comme un commencement de radius inférieur. Par sa position au cellule radiale. Aucune cellule n'étant séparée de celle-ci par des nervures, nous dirons que la cellule radiale existe seule, et que toutes les autres cellules sont confondues avec elle dans l'aile représentée fig. 5.

Cette planche première doit être mise en tête du système alaire, p. 46.

#### PLANCHE II.

- Fig. 1. Formica ligniperda, femelle.
- Fig. 2. Formica ligniperda, ouvrière.
  - 2 a. Mandibule.
  - 2 b. Abdomen vu de côté. On voit par ce moyen que le premier segment de cet abdomen est très-étroit, et ne tient au second segment que par un pédicule mince et court. Sa forme est celle d'une lame ou écaille. Les pédicules qui l'unissent au métathorax et au second segment sont à sa partie inférieure.
  - 2c. Aile de devant. Dans cette aile, la première cellule discoïdale n'est pas fermée, et la troisième discoïdale, ainsi que la première cellule du limbe, sont confondues avec elle.
- Fig. 3. Myrmica rubra, mâle.
  - 3 a. Mandibule.
  - 3 b. Abdomen vu de côté. Dans cet abdomen, le premier segment se compose de deux nœuds, séparés par un rétrécissement: le premier de ces nœuds est un peu en massue, dont la partie mince est du côté du métathorax.

3 c. Aile de devant.

Ces figures appartiennent à l'histoire des Hétérogynides.

Fig. 4. Apis mellifica, femelle.

4 a. Patte vue en dehors.

Fig. 5. Apis mellifica, ouvrière.

5 a. Patte vue en dehors.

5 b. Aile de l'Apis mellifica.

Fig. 6. Apis ligustica, mâle.

6 a. Patte vue en dehors.

Ces figures appartiennent à l'histoire des Apiarites. Cette planche doit être placée vis-à-vis la page 231.

#### PLANCHE III.

Fig. 1. Appareil vitré pour observer les travaux d'une fourmilière. Il se compose d'une table à pieds, dont le dessus reçoit un châssis à cinq pans vitrés, dont le plus étendu fait le fond. Le dessus n'étant point vitré, on recouvre d'une cloche de verre toute l'ouverture. Les Fourmis ne pouvant sortir, il est nécessaire de leur fournir des liqueurs sucrées pour leur nourriture et celle de leurs larves. Ce châssis a été inventé et figuré par M. Huber fils. Voyez le texte. Toutes les parties vitrées laissent voir l'architecture intérieure de la fourmilière, et les diverses cases où sont déposées les diverses espèces de larves et de nymphes.

Fig. 2 et 3. Intérieurs d'arbres pourris, creusés par le Formica ligniperda. Les couches ligneuses extérieures, souvent recouvertes de l'écorce, enveloppent ces galeries, ces planchers et ces cloisons que M. Huber a représentés comme en étant dépouillés, pour faire connaître l'industrie en architecture de ces Fourmis.

Cette planche appartient à l'histoire des Hétérogynides, et doit être placée à la page 98.

#### PLANCHE IV.

Fig. 1 et 2. Ruches ordinaires en osier. Ces ruches sont d'ordinaire revêtues extérieurement d'un mélange de bouse de vache et de terre grasse délayées ensemble. On en fait aussi de même forme avec des torsins de paille. On voit dans la figure deuxième que l'Apis mellifica ne conserve pas toujours la même direction à tous ses gâteaux.

Fig. 3 et 4. Ruches vitrées, telles que Réaumur les a employées pour voir à travers les carreaux ce qui se passait dans la ruche.

3a. Dans les deux figures; contrevents de bois qu'on ouvre pour laisser pénétrer dans l'intérieur de la ruche le jour et la vue de l'observateur. Ces ruches peuvent se composer de divers étages superposés et l'on conçoit la possibilité de les séparer en coupant les gâteaux entre eux, soit avec un conteau, soit avec un fil de fer.

Cette planche appartient à l'histoire des Apiarides, et doit être placée à la page 231.

#### PLANCHE V.

Fig.~1. Portion de gâteau de cire, de l' $Apis\ mellifica$ . La face que l'on voit est composée d'un certain nombre de cellules b, ou-

vertes dans le milieu et vides encore; celles des côtés fermées et plelnes, ou de miel réservé pour les provisions d'hiver, ou de nymphes, soit d'ouvrières, soit de mâles. A ce gâteau sont suspendues trois grandes cellules guillochées, destinées à l'éducation des nymphes ? qui doivent devenir fécondes. La cellule intermédiaire n'est que commencée, les deux autres ont toute leur longueur. Cette figure et celles de la planche quatrième sont empruntées à Réaumur.

Fig. 2. Ruche en cadres ou feuillets employée par Huber et par moi. Susceptible d'être ouverte, comme on le voit dans cette figure, elle laisse voir dans l'intérieur tout ce que l'observateur peut désirer de constater. Elle peut également se diviser, et chacune de ses parties peut se compléter par des cadres surajoutés.

Fig. 3. La même ruche complète et fermée.

3a. L'un des cadres qui composent la ruche, vu de profil.

La lettre b dans les figures 3, indique le tasseau qui sert à soutenir les gâteaux que l'on y place d'avance, pour diriger le travail des Abeilles dans le sens des cadres ou feuillets.

Cette planche appartient à l'histoire des Apiarides, et doit être placée à la page 231.

#### PLANCHE VI.

Fig. 1. Bombus subinterruptus, mâle.

Fig. 2. Bombus subinterruptus, neutre.

2a. Aile de devant.

- 2 b. Patte postérieure de la femelle vue en dehors.
- 2 c. Patte postérieure de l'ouvrière vue en dehors.
- 2 d. Patte postérieure du mâle vue en dehors.
- 2 e. Patte postéricure de la femelle vue en dedans.
- 2f. Patte postérieure de l'ouvrière vue en dedans.

Fig. 3. Bombus subinterruptus, femelle.

Fig. 4. Gâteau de cire, tel qu'il existe dans les nids de Bombus, déjà passablement peuplés. On y voit des cellules elliptiques; les unes ouvertes et dépouillées de cire, sont celles où les Bombus, déjà devenus Insectes parfaits, ont subi leurs métamorphoses; les autres fermées, où des nymplues existent. On y remarque encore des masses irrégulières de cire, dans lesquelles vivent les larves. Souvent des cellules en cire, ouvertes de la même forme que celles qu'offre cette figure, contiennent une petite provision de miel. Cette figure est empruntée à Réaumur.

Cette planche appartient à l'histoire des Bombides et doit y être placée.

#### PLANCHE VII.

Fig. 1. Bombus lapidarius, femelle.

1 a. Patte postérieure vue en dehors.

1 b. Patte intermédiaire vue en dehors.

Cette figure appartient à l'histoire des Bombides, tom. Ier.

Fig. 2. Psithyrus rupestris, femelle.

2a. Patte postérieure vue en dehors.

2 b. Patte intermédiaire vue en dehors.

2c. Aile de Psithyrus.

- 2d. Anus de Psithyrus, femelle.
- Fig. 3. Euglossa cordata, femelle.
  - 3 a. Patte postérieure vue en dedans.
  - 3 b. Aile de devant.
- Fig. 4. Eulæma dimidiata, femelle.
  - 4 a. Patte postérieure.
  - 4b. Aile de devant.

Les trois dernières figures appartiennent au IIe volume. Cette planche doit être placée à l'histoire des Bombides.

#### PLANCHE VIII.

- Fig. 1. Nid de Bombus commencé: a est la porte que se ménagent les Bombus pour y entrer, lorsqu'il sera entièrement couvert de mousse; d sont un petit nombre de cellules, la plupar encore closes, renfermant des nymphes: une seule est ouverte, d'où l'on peut conclure que la Mère-Bombus n'est encore aidée que par une ouvrière; c est la voûte intérieure de circ déjà commencée; b est la base de la voûte de mousse, non encore achevée, mais qui règne déjà tout autour.
- Fig.~2. Le même nid de Bombus achevé : a est la porte d'entrée ; b est l'enveloppe de mousse achevée , et faisant la voûte au-dessus du nid.

Cette planche doit être placée à l'histoire des Bombides.

#### PLANCHE IX.

- Fig. 1. Vespa crabro, femelle.
- Fig. 2. Vespa crabro, ouvrière.
- Fig. 3. Vespa crabro, male.
  - 1 a. Aile ployée de Vespa crabro, ainsi qu'elle l'est dans le repos, c'est-à-dire quand l'insecte ne volc pas.
  - 1b. Aile déployée comme elle l'est dans le vol, ou lorsque l'insecte se prépare à voler.
- Fig. 4. Polistes gallica, femelle.
- Fig. 5. Polistes gallica, male.
- Fig. 6. Polistes gallica, ouvrière.
  - 4a. Aile de la Polistès déployée comme elle l'est dans le vol.

#### PLANCHE X.

- Fig. 1. Nid de Vespa vulgaris : ce nid est toujours construit sous terre. Il est enveloppé de fcuilles d'une espèce de papier, et en outre abrité par la terre.
- Fig. 2. Ce même nid coupé par son milieu. On voit les gâteaux dont il est composé, et qui n'ont qu'un rang de cellules, dont l'ouverture est tournée par en bas. On voit au-si les piliers qui soutiennent les gâteaux et maintiennent entre eux l'écartement. Le gâteau supérieur est suspendu à la voûte par de semblables piliers. On voit que les lames de l'enveloppe, assujetties les unes aux autres par leurs bords, sont cependant distantes les unes des autres et forment des voûtes superposées. Les gâteaux sont de la même matière que l'enveloppe.
- Fig. 3. Gâteau détaché , vu en dessous , présentant les ouvertures des cellules.
  - Fig. 4. Gâteau détaché, vu en dessus, présentant le dessous ou fond des

cellules. On y voit, par exemple, en  $\alpha$ , les piliers dont nous avons parlé. Ils partent assez minces du bord des cellules et s'attachent par un empâtement au fond de celles du gâteau inférieur. Ces figures sont empruntées à Réaumur.

Cette planche appartient à l'histoire des Polistides.

#### PLANCHE XI.

- Fig. 1. Nid de Polistes gallica vu de face, du côté de l'ouverture des alvéoles.
- Fig. 2. Le même  $\operatorname{nid}$  vu  $\operatorname{par}$  derrière,  $\operatorname{du}$  côté  $\operatorname{du}$  fond des cellules ou alvéoles.
- Fig. 3. Nid de la même espèce de Polistes vu de côté, et composé de deux gâteaux superposés. Dans les fig. 2 et 3, a est le pédoncule ou pilier qui so tient le nid; b est le second gâteau construit sur le milieu du premier. Ces figures sont empruntées à Réaumur.

Cette planche appartient à l'histoire des Polistides.

#### PLANCHE XII.

- Fig. 1. Melipona anthidioides, ouvrière.
- Fig. 1 a. Patte postérieure.
- Fig. 1b. Aile de devant.
- Fig. 2. Rophites spinosa, femelle.
  - 2 a. Patte postérieure.
  - 2 b. Aile de devant.
- Fig. 3. Rophites spinosa, mâle.
  - 3 a. Anus de Ropites spinosa, mâle.
- Fig. 4. Systropha spiralis, femelle.
  - 4 a. Patte postérieure.
  - 4 b. Aile de devant.
- Fig. 5. Systropha spiralis, male.
  - 5 a. Anus de ce mâle.
  - 5 b. Son antenne.

Cette planche sera placée à l'histoire des Méliponites. Les quatre dernières figures appartiennent au second volume.

#### PLANCHE XIII.

- Fig. 1. Allodape humeralis, femelle. 1 a. Son aile. —1 b. Sa patte postérieure vue en dehors.
- Fig. 2. Lestis bombylans, femelle.— 2 a. Sa patte postérieure. 2 b Sa patte intermédiaire. Son aile.
- Fig. 3. Lestis bombylans, male.
- Fig. 4. Anthidium Florentinum, femelle. 4 a. Sa patte postérieure vue en dehors. 4 b. Son aile. 4 c. Son abdomen vu en dessous.
- Fig. 5. Antidium Fiorentinum mâle. 5 a. Derniers segments de son abdomen vus en dessous.

#### PLANCHE XIV.

Fig. 1. Crocisa Nubica. — 1 a. Son écusson. — 1 b. Sa patte intermédiaire. — 1 c. Sa patte postérieure. — 1 d. — Son aile.

- Fig. 2. Cœlioxys ruficauda, femelle.—2 a. Anus de cette femelle.—2 b. Sa patte intermédiaire. 2 c. Son écusson.
- Fig. 3. Cœlioxys ruficauda, mâle. -3 a. Anus de ce mâle. -3 b. Son aile.
- Fig. 4. Pasites atra, femelle. 4 a. Son écusson. 4 b. Sa patte intermédiaire. 4 c. Son aile.
- Fig. 5. Ammobates bicolor, femelle. 5 a. Sa patte intermédiaire. 5 b. Son écusson.
- Fig. 6. Ammobates bicolor, mâle. 6 a. Aile de devant.

#### PLANCHE XV.

- Fig. 1. Acanthopus splendidus, mâle.—1 a. Son aile.—1 b. Sa patte intermédiaire.—1 c. Sa patte postérieure vue en dehors.
- Fig. 2. Colletes hirta, femelle.— 2 a. Son ailc.—2 b. Sa patte postérieure vue en dehors.
- Fig. 3. Colletes hirta, male. 3a. Son antenne.
- Fig. 4. Mesocheira bicolor, femelle.—4 a. Sa patte postérieure vue en dehors. — 4 b. Sa patte intermédiaire. — 4 c. Son aile. — 4 d. Son écusson.
- Fig. 5. Melecta aterrima, femelle. 5a. Sa patte intermédiaire. 5b. Sa patte postérieure vue en dehors. 5c. Son écusson. 5d. Son aile.

#### PLANCHE XVI.

- Fig. 1. Stelis nasuta, femelle. 1 a. Sa patte postérieure vue en dehors. 1 b. Son abdomen. 1 c. Son aile.
- Fig. 2. Stelis nasuta,  $m\hat{a}le. 2a$ . Anus de ce mâle.
- Fig 3. Melissoda Latreillii, mâle. 3 b. Son antenne. 3 c. Son aile. 3 a. Sa patte intermédiaire.
- Fig. 4. Prosopis signata, femelle. 4 a. Son aile. 4 b. Sa tête. 4 c. Sa patte postérieure vue en dessous. 4 d. Sa patte intermédiaire.
- Fig. 5. Prosopis signata, mâle. 5 a. Tête de ce mâle.

#### PLANCHE XVII.

- Fig. 1. Xylocopa violacea, femelle. 1 a. Sa patte postérieure.
- Fig. 2. Xylocopa violacea,  $m \hat{a} le.$ —2 a. Sa patte postérieure.—2 b. Hanche et trochanter de cette patte. 2 c. Aile des Xylocopa. 2 d. Tête du mâle.
- Fig. 3. Xylocopa æstuans, femelle.
- Fig. 4. Xylocopa æstuans, måle.
- Fig. 5. Epcolus variegatus, femelle. 5 a. Patte postérieure femelle vue en dedans. 5 d. La même vue en dehors. 5 b. Tête. 5 c. Aile des Epcolus.

#### PLANCHE XVIII.

Fig. 1. Beaucoup plus petite que nature. Morceau de bois détérioré, fendu et laissant voir des tubes creusés par le Xylocopa violacea. Ses tubes séparés en cellules, dont les unes représentées avec l'approvisionnement, et les autres vides. — 1 a. Couvercle qui sépare les cellules. — 1 b. Un des tubes vides, encore plus petit que nature.

Fig. 2. Nid entier de Chalicodoma muraria. — 2 a. Ouverture faite par l'un des individus devenus parfaits dans ce nid. — 2 b. Cellules de la base de ce nid, construites contre un mur. — 2 c. Une de ces cellules non encore terminée et restée ouverte pour recevoir l'approvisionnement de pollen et de miel.

#### PLANCHE XIX.

- Fig. 1. Ceratina albilabris, femelle. 1 a. Sa patte postérieure en dessus. 1 b. La même vue en dessous. 1 c. Aile de la même.
- Fig. 2. Ceratina albilabris, mâle.
- Fig. 3. Panurgus dentipes, femelle.—3 a. Sa patte postérieure en dessus.
   3 b. La même vue en dessous. 3 c. Aile de la même.
- Fig. 4. Panurgus dentipes, mâle. 4 a. Sa patte postérieure en dessous.
- Fig. 5. Xylocopa Carolina, male.— 5a. Sa patte vuc en dessus.— 5b. Aile de la même.
- Fig. 6. Xylocopa Carolina, femelle.—6a. La tête de ce mâle vue en devant pour montrer le rapprochement des yeux.

#### PLANCHE XX.

- Fig. 1. Centris denudans, femelle. 1 a. Sa patte postérieure vue en dessus. 1 b. Aile de la même.
- Fig. 2. Centris derasa, femelle.
- Fig. 3. Chalicodoma Sicula, femelle.
- Fig. 4. Osmia Tunensis, femelle. 4 a. Son aile.—4 b. Son nid dans une coquille. Son abdomen en dessus.
- Fig. 5. Chelostoma culmorum, femelle. 5 a. Tête vue de profil pour montrer le prolongement du labre.
- Fig. 6. Chelostoma culmorum, mâle. 6 a. Dessous de l'abdomen du

#### PLANCHE XXI.

- $Fig.\,$  1. Cellules membraneuses construites et approvisionnées par les Colletes.
- Fig. 2. Cellule construite en pétales de coquelicot par l'Anthocopa papaveris.
- Fig. 3. Megachile centuncularis coupant un des morceaux de feuilles de rosier dont son nid est construit. 3 a. Feuilles de rosier ayant fourni plusieurs morceaux de diverses formes. 3b et 3 c. Tuyaux composés de plusieurs cellules, faits de ces morceaux de feuilles.

#### PLANCHE XXII.

- Fig. 1. Dasipoda hirtipes, femelle. 1 a. Abdomen de cette femelle. —

  1 b. Sa patte postérieure en dessous. 1 c. La même en dessus.

   1 d. Aile de devant.
- Fig. 2. Dasypoda hirtipes, male. 2a. Abdomen de ce mâle.
- Fig. 3. Andrena collaris, femelle. 3a. Sa patte postérieure vue en dessous. 3b. La même en dessus. 3c. Aile de devant.
- Fig. 4. Andrena collaris, mâle.
- Fig. 5. Hallctus cinctus, femelle. 5 a. Sa patte postérieure en dessus. -

- 5 b. La même en dessous. 5 c. Tête de la femelle. 5 d. Alle de devant. 5 e Bout de l'abdomen.
- Fig. 6. Halictus cinctus, male. 6 a. Tête de ce mâle.

#### PLANCHE XXIII.

- Fig. 1. Meliturga clavicornis, femelle. 1 a. Sa patte postérieure en dessus. 1 b. Antenne de la femelle. 1 c. Antenne du mâle. 1 d. Aile de devant.
- Fig. 2. Anthophora acervorum, femelle. 2a. Sa patte postérieure. 2b. Aile de devant.
- Fig. 3. Anthophora acervorum, mâle. 3 a. Sa patte postérieure. 3 b. Sa patte intermédiaire.
- Fig. 4. Anthophora hispanica (plus petit que nature). 4a. Son aile. 4b. Sa patte postérieure.

#### PLANCHE XXIV.

- Fig. 1. Sphecodes gibbus, femelle. 1 a. Sa patte postérieure vue en dessous. 1 b. La même en dessus. 1 c. Antenue de la femelle. 1 d. Aile de devant.
- Fig. 2. Sphecodes gibhus, mâle. 2 a. Antenne du mâle.
- Fig. 3. Nomada varia, femelle. 3 a. Sa patte postérieure vue dessus. 3 b. La même vue en dessous. 3 c. Aile de devant.
- Fig. 4. Nomada varia, mâle.
- Fig. 5. Prosopis signata, femelle. 5 a. Sa tête vue de face. 5 b. Tête du mâle. 5 c. Patte postéricure vue en dessus. 5 d. La même vue en dessous.

#### PLANCHE XXV.

- Fig. 1. Cerceris capito, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Philanthus Abdelcader, femelle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Psen atratus, femelle. 3 bis. Son alle.
- Fig. 4. Nysson Dufourii, male. 4 bis Son aile.
- Fig. 5. Hoplisus quinque-cinctus, male. 5 bis. Son antenne.
- Fig. 6. Euspongus laticinctus, male. 6 bis. Son tarse postérieur.
- Fig. 7. Arpactus Carceli, mále. 7 bis. Son antenne. 7 ter. Son aile.
- Fig. 8. Gorytes mystaceus, femelle.

#### PLANCHE XXVI.

- Fig. 1. Alyson lunicornis, male. 1 bis. Son aile. 1 ter. Bout de l'antenne.
- Fig. 2. Cemonus unicolor, femelle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Pemphredon oraniense, femelle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Stygmus pendulus, male. 4 bis. Son ailc.
- Fig. 5. Crabro comptus, mâle. 5 bis. Son antenne.
- Fig. 6. Blepharipus mediatus, male. 6 bis. Son antenne.
- Fig. 7. Thyrcopus clypeatus, mâle. 7 bis. Son antenne.
- Fig. 8. Crossocerus subpunctatus. 8 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXVII.

- Fig. 1. Nitela Spinolæ, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Oxybelus bellicosus, male. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Trypoxylon albitarse, femelle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Palarus flavipes, male. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Dinotus pictus, male. 5 bis. Son aile.
- Fig. 6. Miscophus bicolor. 6 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXVIII.

- Fig. 1. Tachytes oraniensis, femelle. -1 bis. Son alle.
- Fig. 2. Astata boops, male. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Bombex rostrata, mâle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Monedula Carolina, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Hogardia rufescens, femelle. 5 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXIX.

- Fig. 1. Stizus rufipes, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Pelopœus pensilis, femelle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Podium goryanum, fimelle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Ampulex compressus, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Dolichurus bicolor, femelle. 5 bis. Son aile. Fig. 6. Chlorion viridi-æneum, femelle. 6 bis. Son aile.

#### • •

- Fig. 1. Pronœus maxillosus, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Ammophila argentata, femelle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Sphex afra, femelle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Ammophila armata, mâle. 4 bis. Sa face vue un peu sur le côté.

PLANCHE XXX.

Fig. 5. Miscus campestris, femelle. — 5 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXXI.

- Fig. 1. Coloptera barbara. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Aporus unicolor. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Evagetes bicolor. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Salius bicolor. 4 bis. Dessus du corselet.
- Fig. 5. Salius punctatus. 5 bis. Dessus du corselet.

#### PLANCHE XXXII.

- Fig. 1. Micropterix brevipennis, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Calicurgus lutepennis, male. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Pompilus albonotatus, mâle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Anoplius variegatus, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Macromeris splendida, mâle. 5 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXXIII.

- Fig. 1. Ferrcola Algira, femelle. 1 bis. Son alle.
- Fig. 2. Ceropales variegata. 2 bis. Son aile.

- Fig. 3. Pepsis elongata, femelle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Pallosoma barbara, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Pallosoma barbara, mâle. 5 bis. Son antenne.

#### PLANCHE XXXIV.

- Fig. 1. Scolia aureipennis, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Scolia erythrocephala, mâle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Campsomeris lucida. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Colpa aurea, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Colpa aurea, mâle. 5 bis. Son antenne.

#### PLANCHE XXXV.

- Fig. 1. Tiphia capensis, femelle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Tiphia villosa, femelle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Meria tripunctata, mdle. 3 bis. Son aile.
- Fig. 4. Sapyga prisma, femelle. 4 bis. Son aile.
- Fig. 5. Sapyga prisma, mâle. 5 bis. Son antenne.
- Fig. 6. Thynnus Westwoodii, mâle. -6 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXXVI.

- Fig. 1. Elaproptera Servilii, mâle. 1 bis. Son aile.
- Fig. 2. Methoca ichneumonoides, måle. 2 bis. Son aile.
- Fig. 3. Plesia namea, femelle. 3 bis. Ailes de la Plesia fuliginosa.
- Fig. 4. Myrmosa melanocephala, femelle. 4 bis. Dos de son corselet.
- Fig. 5. Myrmosa atra, mâle. 5 bis. Son aile.
- Fig. 6. Mutilla maura, femelle.
- Fig. 7. Mutilla maura, male. 7 bis. Son aile.
- Fig. 8. Mutilla occidentalis, male. 8 bis. Son aile.

#### PLANCHE XXXVII.

- Fig. 1. Parnopes carnea. 1 a. Aile de devant. 1 b. Antenne. 1c. Patte de devant.
- Fig. 2. Cleptes semi-aurata. 2a. Aile de devant. 2b. Antenne.
- Fig. 3. Stilbum calens. 3 a. Aile de devant. 3 b. Profil du corps.
- Fig. 4. Euchæus purpuratus. 4 a. Aile de devant.
- Fig. 5. Hedychrum lucidulum. 5 a. Aile de devant.
- Fig. 6. Chrysis ignita. 6 a. Aile de devant.

#### PLANCHE XXXVIII.

- Fig. 1. Leucospis gigas, male. 1 a. Antenne.
- Fig. 2. Leucospis gigas, femelle.
- Fig. 3. Chalcis (Smiera) clavipes.
- Fig. 4. Conura bicolor.
- Fig. 5. Chirocerus furcatus, mâle, vu de profil.— 5a. Le même vu sur le dos. 5 b. Antenne.
- Fig. 6. Galearia violacea, femelle, vu de profil. 6 a. Le même vu sur le dos. 6 b. Antenne.

#### PLANCHE XXXIX.

- Fig. 1. Psilogaster pallipes, male. 1 a. Antenne.
- Fig. 2. Ibid. femelle. -2a. Antenne.

- Fig. 3. Perilampus cyaneus. 3 a. Le même, vu de profil. 3 b. Antenne.
- Fig. 4. Proctotrupes rufipes. -4a. Antenne
- Fig. 5. Cynips gallarum. 5 a. Antenne. 5 b. Aile de devant.
- Fig. 6. Oryssus coronatus, mâle. 6a. Antenne (à laquelle manque le dernier article). 6b. Aile de devant.

#### PLANCHE XL.

- Fig. 1. Rhyssa atrata, femelle. 4 a. Abdomen vu de trois quarts.
- Fig. 2. Rhyssa levigata, male.
- Fig. 3. Mesostenus variegatus, femelle. 3 a. Abdomen vu de profil.
- Fig. 4. Anomalon flavicorne. 4 a. Abdomen de profil. 4 b. Aile de devant.
- Fig. 5. Megischus annulator, femelle. 5 a. Abdomen de profil.

#### PLANCHE XLI.

- Fig. 1. Hemigaster fasciatus, femelle. 1 a. Aile de devant.
- Fig. 2. Westwoodia ruficeps. 2 a. Aile de devant. 2 b. Abdomen de profil.
- Fig. 3. Cryptus formosus, femelle. 3 a. Abdomen de profil.
- Fig. 4. Macrogaster rufipennis, femelle. 4a. Aile de devant.
- Fig. 5. Christolia punctata.
- Fig. 6. Cryptanura nigripes.

#### PLANCHE XLII.

- Fig. 1. Ischnoceros dimidiatus, femelle. 1 a. Aile de devant.
- Fig. 2. Atractodes albitarsis. 2 a. Aile de devant. 2 b. Aréole grossie.
- Fig. 3. Thyreodon cyaneus, femelle. 3 a. Aile de devant. 3 b. Abdonien de profil.
- Fig. 4. Macrus rufiventris. 4 a. Aile de devant.
- Fig. 5. Ophiopterus coarctatus, femelle.
- Fig. 6. Podogaster coarctatus, femelle. 6 a. Aile de devant.

#### PLANCHE XLIII.

- Fig. 1. Joppa antennata, femelle. -1a. Antenne.
- Fig. 2. Trogus exesorius. 2 a. Aile de devant. 2b. Une portion d'antenne.
- Fig. 3. Bracon bicolor, femelle. 3 a. Aile de devant.
- Fig. 4. Megalyra fasciipennis, femelle.
- Fig. 5. Pelecinus polycerator, femelle.

#### PLANCHE XLIV.

- Fig. 1. Evania appendigaster, vu de profil.
- Fig. 2. Agathis desertor, male.
- Fig. 3. Fornicia clathrata.
- Fig. 4. Sigalphus (Rhitigaster) irrorator, vu de profil.
- Fig. 5. Chelonus oculatus.
- Fig. 6. Myosoma hirtipes, vu de profil.

#### PLANCHE XLV.

Fig. 1. Sirex (Urocerus), Edwardsii, femelle.—1 a. Aile du S. gigas.—

1 b. Antenne du même.—1 c. Patte postérieure du S. juvencus mâle.

- Fig. 2. Tremex Servillei, femelle. 2 a. Aile de devant. 2 b. Antenne.
- Fig. 3. Xiphidria fasciata, femelle. 3 a. Aile de devant. 3 b. Antenne.
- Fig. 4. Cephus abdominalis. 4 a. Aile de devant. 4 b. Antenne.
- Fig. 5. Lyda fausta. -5 a. Aile de devant. -5 b. Antenne.
- Fig. 6. Tarpa Olivieri. 6 a. Aile de devant. 6 b. Antenne du T. Panzeri.

#### PLANCHE XLVI.

- Fig. 1. Pterygophorus bifasciatus, femelle. 1 a. Aile de devant 1 b. Antenne.
- Fig. 2. Perreyia lepida. 2a. Aile de devant. 2b. Antenne.
- Fig. 3. Lophyrus pini, male. 3 a. Antenne.
- Fig. 4. Ibid., femelle. 4a. Aile de devant. 4b. Antenne.
- Fig. 5. Dictynna Westwoodii. 5 a. Aile de devant. 5 b. Antenne.
- Fig. 6. Athalia Blanchardi. 6 a. Aile de devant. 6 b. Antenne,
- Fig. 7. Cladius Morio, femelle. 7a. Aile de devant. 7b. Antenne du C. difformis, mâle. 7c. Ibid. du C. rufipes, mâle.
- Fig. 8. Waldheimia Orbignyana. 8 a. Aile de devant. 8 b. Antenne.


#### PLANCHE XLVII.

- Fig. 1. Dolerus dimidiatus, mâle 1 a. Aile de devant. 1 b. Antenne.
- Fig. 2. Dolorus dimidiatus, femelle.
- Fig. 3. Empria (Emphytus) pallimacula. 3a. Aile de devant. 3b. Antenne.
- Fig. 4. Schizocerus obscurus, femelle. 4 a. Alle de devant. 4 b. Antenne.
- Fig. 5. Sericocera Spinolæ.— 5 a. Aile de devant.— 5 b. Antenne. 5 c. Aile antérieure d'une espèce semblable pour les couleurs, mais fort différente quant à la disposition des nervures des ailes.
- Fig. 6. Pachylota Audouini. 6a. Aile de devant. 6b. Antenne. 6c. Patte postérieure.
- Fig. 7. Hylotoma janthina. 7a. Aile de devant. 7b. Antenne du mâle. 7c. Antenne de la femelle.
- Fig. 8. Didymia Martini, mâle. 8 a. Aile de devant. 8 b. Antenne du mâle. 8 c. Antenne de la femelle.

#### PLANCHE XLVIII.

- Fig. 1. Perga scutellata. 1a. Antenne.
- Fig. 2. Sizygonia cyanocephala (par erreur cyanea sur la planche). 2a. Aile de devant. 2b. Antenne.
- Fig. 3. Plagiocera Klugii. -3a. Aile de devant. -3b. Antenne.
- Fig. 4. Pachylosticta albiventris. 4a. Aile de devant. 4b. Antenne.
- Fig. 5. Amasis læta. 5a. Aile de devant. 5b. Antenne.
- Fig. 6. Cimbex Kirbyi. 6a. Aile de devant. 6b. Antenne.


Hyménoptères



Venner pure Borromee du Leacunssei sculp

- 1 Ale surcomplete 2 La même alle decomposée. 5 Alle complete ... + Alle meanuplete .
- s . Ale trés incomplete .






1 Formica Laginperda \$\frac{2}{2}\$ 2 Formica Laginperda \$\frac{2}{2}\$ 2 a Mandibuse de eute Formica 2 b son Abdomen ou de côte 2 c aile de la même 5 Myrimea Rubra \$\frac{1}{2}\$ 3 a Mandibuse de la Myrimea 3 b son Ibdomen ou de côte 3 c lile de la Myrimea 4 Apis Mellifica \$\frac{1}{2}\$ 4 a sa Patte poste vieure que en dehors \$\frac{1}{2}\$ Apis Mellifica \$\frac{1}{2}\$ 5 a sa Patte posterioure une en déhors \$\frac{1}{2}\$ 6 Alle de l'Apis Mellifica \$\frac{1}{2}\$ 5 a sa Patte posterioure que en déhors \$\frac{1}{2}\$ 6 Apis Legustica \$\frac{1}{2}\$ 6 a sa Patte posterioure que en déhors




Hymenopteres Pt. 3.



Meunier pins Borromce dir Daucene sculp

. Four millere mise dans un appareil vitre. -2 et 5 . Arbres creusés par les four mis pour l'établissement de leur nid


Hyménoptères Pl. 4.



Meunier pinx Borromee dir Giagnet sculp


1 et 2. Ruches ordinaires en osier. 5 et 4 Ruches vitrées à plusieurs étages qui peuvent se séparer. a. Contrevente qu'on ouvre à volonté pour observer les abeilles au travers des carreaux.


Hyménoptères. Pl. 5.



Menner puss Borronnee der Guignet sculp

i Gateau compose de cellules ordinaires b, les unes férmées les autres ouvertes, et portant des cellules rojales— à Céllules ou sont élevées les méres, vulgairement cellules rojales— b. téllules ordinaires, les nuces férmées, les autres ouvertes— 2. Ruche à classis qui peuvent s'ouvert et se separer à volonte. 5 La même ruche vue entrérement férmée— à Lun des chasses ou de profit— b. Tasseau qui sert à souteur les gâteaux.






1 Bombus sub intercuptus  $\stackrel{\checkmark}{\xi}$ . 2 Bombus id  $\stackrel{?}{\delta}$ . 5. Bombus id  $\stackrel{?}{\xi}$ . 2 a Alle de ce Bombus. 2 b. Patte posterieure  $\stackrel{?}{\xi}$  nue en disseux. 2 d. Patte posterieure  $\stackrel{?}{\xi}$  nue en disseux. 4 Gâteau de circe tel qu'on le trouve dans les inds de Bourdons qui sont déja passablement peuples.




Hymenopteres P1. ~ z. b 2.6. 36

1 Bombus Lapidarius ? 1 a sa l'atte pasterieure viue en deseux 1 b su l'atte intermédi aire viue en deseux 2 Psithyvus Rupestris ? 2 a sa l'atte poster l'uie en deseux 2 b sa l'atte intermédiaire viue en deseux 2 c san Alle 2 d Anns de ce l'edhyrus ? 5 Euglossa Cordata ? 3 a sa l'atte postérieure viue en deseoux 3 b san Alle 4 Eulaima Dimidiata ? 4 a sa l'atte posterieure 4 b son Alle


Venner pins







1 Nid de Bourdons commencé — a Entrec de ce nul. b.Bouler de circ dans lesquelles cont deposes les œuks—c Enveloppe de circ commence — d Enveloppe de mousse commence n'ayant pas encore de tout—2 Nid de Bourdons acheve tel qu'ils les font à la superficie de la terre a Entree du nul — b Enveloppe de mousse avec sa noute

•				




t Vespa Crabro  $\frac{2}{3}$  2 Vespa Crabro  $\frac{2}{3}$  5 Vespa Crabro  $\frac{1}{5}$  1 a Mile ployée comme elle l'est dans le repus 1 a Mile déployée comme elle l'est dans le rol 4 Polistes Gallica  $\frac{2}{3}$  5 Polistes Gallica  $\frac{1}{3}$  4 a Mile deployée comme elle l'est dans le vol





1 Vid du Vespa vulgaris entier avec ses enveloppes 2 Le même nid coupé par son milieu 5. Gâteau vu en dessons, sur cette fâce sont les ouvertures des alvéoles 4 Le meme gateau vu en dessus la sont les fonds des alvéoles a Piliere que contiennent les gateaux.

Hyménoptères Pl.11.




Heunur pinx Borronice du Decesne sculp


1 Nid du Polistes Gallica vu de face du côte de Fouverture des alveoles. 2 Le même vu par derrière du côté du fond des alvéoles. 5 Nid de la même espèce vu de côté et composé de deux gateaux. a Pedoncule ou pilier qui soutient le nid. 6 Second gateau construit sur le milieu du premier.



Ilyménoptères Pl 12




t Melipona Anthidioides  $\frac{Q}{2}$  1 a sa l'atte postèrieure once en dehors - i b son lile - 2 Rophites Spinosa  $\frac{Q}{2}$  2 a sa l'atte postèrieure une en dehors - 2 b son lile - 5 Rophites Spinosa  $\frac{Q}{2}$  3 a Anas du Rophites Spinosa  $\frac{Q}{2}$  4 Systropha Spiralis  $\frac{Q}{2}$  4 a sa l'atte postèrieure une en dehars - 4 b son lile - 5 Systropha Spiralis  $\frac{Q}{2}$  5 a Inus de ce mûle - 5 b son Interne




1 Mlodapé Humeralis  $\frac{1}{2}$  La son Ale Lh sa l'atte postèricare que en dehors (2. Lestis Bombylans  $\frac{1}{2}$  La sa l'atte postèricare). Lh sa l'atte intermédiaire (2.c., san Ede.) 3. Lestis Bombylans  $\delta$ . (4. Anthidium Florentinum  $\frac{1}{2}$ . La sa l'atte postèricare que en dehors (4.h. san Ede.) Le san Abdomen vu en desseux. (5. Anthidium Florentinum  $\delta$ . 3 a derners segments de son Abdomen vux en desseux.






Croersa Nubrea 2 La sen Ecusion 1 b sa l'atte intermédiaire 1 c sa l'atte postèreure, 1 d son Aile
 Colioxys Ruticanda 2 2a Anno de cette femelle 2 b sa l'atte intermédiaire 2 c son Ecusion.
 Calhoxys Ruticanda 2 3a Anno de ce mâle 3 b san Aile 4 Pasites Atra 2 4a sen Ecusion 4 b sa l'atte intermédiaire 4 c, son file 5 Annobates Brodov 2 5a sa l'atte intermédiaire 5 b son l'ension.
 Annobates Bicolor 5 6a Aile de l'Annobates.






Acanthopus Splendidus & La. son Sile. Th. sa Patte intermédiaire. Le. sa Patte postéreure une en dehors.
 Colletes Hirta & 2a son Sile. 2h sa Patte postéreure une en dehors.
 Colletes Hirta & 3a. son Sulenne.
 Mesocheira Bicolor & 4a sa Patte postéreure une en dehors.
 Losa Patte intermédiaire.
 son Aile. 4d. son Ecusion.
 Melveta Atterrima & 5a. sa Patte intermédiaire.
 b. sa Patte postéreure une en dehors.
 c. son Ecusion.
 d. son lile.





1. Stels Nombre, La sa Patte posteriorare que en dehare. El sem Malamen, Le san libe. 2. Stelss-Nombre 2 a Timo de comide. 5 Melissada Laterillo & 3 le san latenne. 3 e san libe. 3 a Patte internistrativo de la Melissada. 4 Percepa, sociativo q. 4 a san del 4 le Péte de la Procupio Spirial de 4 le sa Lango ser succentro de socio 4 de se botto partir socio me en destino se Procupio segnato de a Procupio segnato.



1 XvIocopa Victacea g. La su l'utte postérieure. 2. XvIocopa Violacea & 2a sa l'utte postérieure. h. llanche et Trochantee de cette l'utic. 2 c. Aile des Xulocopa. 2 d. l'ête du & 5. XvIocopa Esmans g. 4. XvIocopa Esmans & 5. Epoclus Varregatus g. 6. Epoclus Varregatus & 5. á.a. l'utte postérieure g nue en deduis : 1. la même nue en debers. 3 h. l'ête. 3 c. Aile des Epoclus.








Fig. 1. Beaucoup plus petite que nature. Morceau de bois deteriore, fendu et laissant voir des tubes creusés par la Aylocopa Violacea. Ces tubes séparés en cellules dont les unes représentees avec l'approvisionnement et les autres vindes. La Councrele qui separe les cellules Lb l'un des indes madres, careire plus petit que nature. 2 Nid entire de la Chaheodoma Muravia. 2 a. nuverture faite par l'un des individus devenus parfoits dans ce nud. 2 b. Cellules de la base de ce nud construites contre un mur. 2 c. une de ces Cellules non encor terminée et restée nuverte pour recevoir l'approvisionnement de l'ollen et de Miel.





1. Cevatina Albilabris Q La, su l'atte postérieure en dessus 1 b. la même vue en dessuiv. LC. Sile de la même 2. Ceratina Albilabris & 3. Paningus Dentipos Q. 3 a. su l'atte postérieure en dessus. 3 b. la même vue en dessuis 3 c. Aile de la même. 4. Paningus Dentipos & 4 a. su l'atte postérie en dessuis. 3 d'Asponia & Axlocopa Carolina Q. 5 a. su l'atte vue en dessuis 3 b. Aile de la même. 6. Avlocopa Carolina & 5 a. la l'éte de ce & vue en devant pour montrer le rapprochement des geux






1. Centris Denudans Q La sa l'alle postérieure en dessus. 1 h. Alle de la même. 2. Centris Denasa Q. 5. Chalivodoma Sivula Q. 4. Osmia Tunensis Q. 4a son Mer. 4 h. son Nid dans une cognille. 4c son Midomen en dessus. 5. Chelostoma Culmovum Q. 3 a. Tête nue de profil pour mantrer le prolongement du Labre. 6. Chelostoma Culmovum 8. 6 a. descens de l'Abdomen. 8.

.




1 Cellules membraneuses construites et approvisionnées par les Colletes. 2 Cellule construite de femilles de Coquelicot par l'Anthocopa l'apraveris. 5. Megachdé Centinieularis coupant un des morceaux de femilles de Rosier dont son indest construit. 3 a Femilles de Rosiers ayant, fourni, plusièrem morceaux de diverses formes. 3 b et 3 c. Tantur composée de plusieques Céllules, faits de ces morceaux de fémilles.




1 Dasypoda Hivtipes 9, 1 a. Molomen de cette femelle 1 b sa l'atte postérieure en devous 1 c. la même en devous 1 d. Ade de la Basypoda 2 Dasypoda Hivtipes \$, 2 a Molomen de ce \$, 5 Andrena Collaris 9 3 a sa l'atte postérieure en devous 3 b, la même en devous 3 c. Atte de l'Indrena 4 Andrena Collaris \$ 5 Halictus emetus 9, 5 a, sa l'atte postérieure en devous \$ b la même une en devous \$ c. Tête de la fémelle 1 d. ble de l'Indrena 5 e, bout de l'Indomen. 6 Halictus emetus \$ 6 a Tête du \$.






1 Weltturga Clavicovurs Q. La su l'utte postèreure en dosno (1) Intenne de la fonelle (1) Intenae du mile (1) l'île de la l'eletarga (2) Anthophora Vecryorum Q. 2 à sa l'atte pestéreure (2) l'île de l'Inthophora (3) Anthophora Vecryorum 6, 3 à sa l'atte pestéreure (2) à sa l'atte internació (4) Anthophora Hispanira plus petite que nature (1) 4 à sur l'ile (1) l'accessibilitation.






Sphecodes Gibbus Q 1 a. su l'atte postérieure une en dossous. 1 b. la même en dossus 1 c. Intenne de la Q, 1 d. Aite du Sphecodes. 2. Sphecodes Gibbus 5, 2 a., Intenne du 5, 5 Nomada Varia Q, 3 a. su l'atte postérieure une en dessous. 3 b. la même une en dessous. 3 c. Aite de la Nomada 4 Nomada Varia 5. s. Prosopis Signata Q 5 a. Tête de celle-ci une de face. 5 b. Tête du mâte. 5 c. l'atte postérieure une en dessous. 5 d. la même une en dessous.




1. Cerceris Capito, fimelle 1<sup>60</sup>son ade. 2 Philanthus Abdeleader femelle. 2<sup>for</sup>son ade. 5. Pseu atratus femelle. 3<sup>for</sup>son ade. 4 Nysson Dufouru male. 4<sup>for</sup>son ade. 5. Hoplisus Quinque-cinctus male. 3<sup>for</sup>son antenne 6. Euspongus Laticinclus male. 6<sup>for</sup>son tarse posterieur. 7. Arpactus Carceli mile. 7<sup>for</sup>son antenne 7<sup>for</sup>son ade. 8. Gorytes Mystaccus femelle.






Myson Lunicornis mâle L<sup>hu</sup>son ade L<sup>hu</sup>son ade L<sup>hu</sup>son ade.
 Pemphredon Oranicuse femelle. 3<sup>hu</sup>son ade.
 Syogmus Pendulus mâle. 4<sup>hu</sup>son ade.
 Crabro comptus mâle. 5<sup>hu</sup>son antenne.
 Blepharipus Mediatus mâle. 6<sup>hu</sup>son antenne.
 Thyreopus Gypeatus mâle. 7<sup>hu</sup>son antenne.
 Crossocerus subpunctatus. 8<sup>hu</sup>son aile.






1. Nitela Spinoke fenelle, 18<sup>th</sup> son alle 2. Oxybelus Bellicosus måle, 2<sup>th</sup> son alle 5. Trypoxylon Albitarse fenelle, 3<sup>th</sup> son alle 4. Palarus Flavipes måle, 4<sup>th</sup> son alle 5. Dinetus pietus mor 3<sup>th</sup> son alle 6. Miscophus Bicolov, 6<sup>th</sup> son alle




i. Tachytes Oranieusis fémelle.  $z^{ba}$  son aile. 2. Astata Boops mile.  $2^{ba}$ son aile. 5. Bembex rostrata mas.  $3^{ba}$ son nile. 4. Monedula Carolona femelle  $4^{ba}$ son aile. 5. Hogardia rufescus f:  $3^{ba}$ son aile






1. Suzus vulipes témelle 1. the son alle 2. Pelopœus pensilis fémelle. 2 the son alle. 5. Podium Gorvanum fémelle 3 the son alle. 4. Ampulex compressus fémelle. 4 the son alle. 5. Dolichurus bicolor fémelle 3 the son alle. 6. Chlorion vividi-œueum fémelle. 6 the son alle.

\* 




1. Fronteus maxillosus *fémélle. 1 the son ade.* 2. Ammophila argentata *fémélle. 2 tha son ade.* 5. ophex afra *fémélle. 3 the son ade.* 4 Ammophila armata *mále. 4 the sa face une na pen sur le ceté* 5. Miseus campestris *fémélle. 5 the son ade.* 






1 Coloptera barbara. L<sup>har</sup> son aile. 2. Apovus unicolor. 2<sup>har</sup> son aile. 5. Evagetes bicolor. 3<sup>ha</sup> son aile. 4 Salius bicolor. 4<sup>har</sup> docum du consolet. 5 Salius pinetatus. 5<sup>har</sup> docum du consolet.







1 Micropterix brevipennis sémeste. 18th son acte. 2 Calicurgus Interpennis máte. 28th son acte. 5 Pompilus variegatus sémeste. 48th son acte. 5 Macromeris splendida máte. 38th son acte. 5 Macromeris





1. Ferreola Algira jemelle. 18th son aile. 2. Ceropales variegata 2 the son aile. 5. Pepsis elongata. ionelle. 38th son aile. 4. Pallosoma barbara jemelle. 48th son aile. 5. Pallosoma barbara mile. 5th son mile.






1 Scolia aureipensis jimille 1<sup>bis</sup>son arte. 2 Scolia trythrocephala mile 2<sup>bis</sup>son arte. 5. Campsomeris bueida. 3<sup>bis</sup>son arte. 4 Colpa aurea jimille. 4<sup>bis</sup>son arte. 5. Colpa aurea. 5<sup>bis</sup>son antenne.


1. Tiphia capensis femelle 1<sup>bu</sup> son alle 2. Tiphia villosa femelle 2<sup>bu</sup> son alle. 3. Meria tripunctata mile. 3<sup>bu</sup> son alle 4. Sapvga prisma femelle 4<sup>bu</sup> son alle. 5. Sapvga prisma mile. 5<sup>bu</sup> son allemente. 6. Thymnus Westwodii mile. 6<sup>bu</sup> son alle.

. • . ·




i Elaproptera servilii mile.  $t^{ba}$ son ale. 2. Methoca ichneumonoides mile.  $2^{ba}$ son ale. 5. Plesia namea  $t^{bm}$ elle.  $3^{ba}$ sule de la l'Iesia falquiesa . 4. Myrmosa melanocephala  $t^{bm}$ elle.  $4^{ba}$ fosde son carcelet. 5. Myrmosa atra mile.  $5^{ba}$ son ale. 6. Mutilla maura  $t^{bm}$ elle. 7. Mutilla maura  $t^{bm}$ elle. 7. Mutilla maura  $t^{bm}$ elle. 8. Mutilla occidentalis  $t^{ba}$ son  $t^{ba}$ son t






- i. Parnopes carnea Enti-
- 4 Euchraus purpuratus 1976
- 2. Cleptes semiaurata. Lop
- 5 Hedvehrum Incidulum Ed
- Stilbum calens Fib
- 6 Chrysis ignīta. Zīn





.




+ Psilogaster pathpes (200) + Positotrupes rutipes (200)

- z . Psilogaster pallipes  $\varphi, \mathcal{M}$
- a Cymps gallarum 800
- 5. Perilampus cyaneus.#c
- 6. θryssus coconatus κώ




Mymémoptères. Pl. 4a.



1 Rhyssa atrata - 18th - 2. Rhyssa levigata. 18th - 5 Mesostenus variegatus. 18th - 4 Anomalon flavieorne. 18th - 5 Megischus annulator. 18th

*			
		,	




1 Reimgaster fasciatus 🚁 4 Nacrogaster infipenius 🛪

- 2 Mestwoodia ruficeps. #/
- 5. Christofia punetata 🚁
- 5 Cryptus formosus. #r
- 6 Cryptanura nigripes, #










- r Ischnocoros dinidiatus, #
- 4. Macrus rutiventris 76.
- 2. Airactorles albatarsis #
- a. Ophiopterus coaretatus 🔊
- 5. Thyreodon gyaneus. 🔊
- 6 Podogaster coarctatus 🚜





t Joppa antennata. Alba 2. Trogus exesorius. Alba, 5. Bracon bicolor. Br. 4. Megalyra fasciipennis. Nashu 5. Pelecinus policerator. Alba.






- 1 Evania appendigaster. 34 4 Sigalphus irrorator. 144
- 2 Agathus desertor. Zin5 Chelonus oculator Zin
- 5. Formeia elathrata. *Br*
- 6 Myosoma hirtipes Br




Hyminoptieres. Pl 45.



1 Sirex Edwardsii. Br

2. Tremex Servillei. B

- 5 Xiphidira fasciata. Zep
- + Cephus abdomirahs. Zau 5. Lyda fausta Klag
- 6. Tarpa Olivieri. Br.




t Pterygophorus bifasciatus 🛷

- 2. Perrevia lepida. Br 5. Lophyrus pini & Fab

- 4 Lophyrus pini. 9 But
- 5. Dictynna Westwood<br/>n. 27. 6. Athalia. Blanchardi. 26
- T. Cladius morio 9 300
- 8 Waldheimia Orbignyana. Br






2 Dolerus dimidiatus. 4 14 i Dolerus diundiatus \* Lep

4 Seluzocera obsenra Br 6. Pachylota Audonim Westw. 5 Sericocera Spinolæ, 🚈


7. Hylotoma janthina 1829 8 Didymia Martin 1829





+ Perga sentellata. Zeach


- 4 Pachylostica albiventris Ring
- 2 Sizygonia cyanca. *Klay* 5. Amasis lata. *Kdb*
- 5 Plagrocera Klugit & 6 Cimbex Kirbyi, &r.











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00441250 8

nhent QL563 L59

Histoire naturelle des insectes.